



GASTROVITA LTDA – ME
CNPJ: 16.586.685/0001-30
Rua São Pedro, 1970 – Centro
Teresina – Piauí
CEP: 64.001-260

ORIENTAÇÕES AO PACIENTE PARA A ENDOSUTURA GÁSTRICA

ENDOSUTURA GÁSTRICA

Endosutura Gástrica também conhecida como Gastroplastia Endoscópica Redutora é um procedimento por endoscopia em que um aparelho é introduzido no estômago, sendo realizada uma sutura endoscópica, produzindo pregas internas na parede do órgão, reduzindo o espaço disponível para o armazenamento de alimentos. Dessa forma, consegue-se a saciedade com pouco alimento fazendo com que o paciente perca peso.

Este procedimento está indicado para pessoas obesas com IMC (Índice de Massa Corpórea) entre 30kg/m² e 40kg/m², ou acima de 40kg/m², que não queiram se submeter aos métodos tradicionais (cirurgias bariátricas –sleeve, by-pass gástrico...)

COMO É REALIZADO

É introduzido um tubo flexível pela boca, assim como acontece em um exame comum de endoscopia, mas com anestesia geral. Com ampla visão do estômago, o endoscopista realiza suturas no órgão, reduzindo seu volume, deixando-o em forma tubular.

PREPARO PARA O PROCEDIMENTO

- Não coma ou beba nada 8 horas antes do exame.
- Comparecer ao Hospital: ____:____

QUAL O TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO

- É um procedimento rápido, dura em média 60 minutos.

OBSERVAÇÕES

- Tomar medicações de uso diário normalmente.
- Paciente com hipertensão arterial em tratamento, deve-se tomar a medicação às 5 horas da manhã com meio copo de água.
- Se fizer uso de hipoglicemiante (remédio para diabetes), não deverá tomá-lo no dia do exame.
- Os procedimentos endoscópicos podem ser realizados em pacientes em uso de Anticoagulantes e AINES na ausência de outras condições hemorrágicas pré existentes, para tanto, deve-se procurar o seu médico assistente para verificar a possibilidade de suspendê-los de acordo com as orientações descritas abaixo:

DROGA:	SUSPENDER:
Ácido acetilsalicílico (AAS, Aspirina, Aspirina Prevent, Somalgin, Ecasil)	Não precisa suspender
Dipiridamol (Persantin)	2-3 dias antes do exame

Clopidogrel (Plavix)	5-7 dias antes do exame
Ticagrelor (Brilinta)	3-5 dias antes do exame
Prasurgel (Effient)	5-7 dias antes do exame
Ticlopidina (Ticlid)	10-24 dias antes do exame
Abciximab (ReoPro)	24 horas antes do exame
Eptifibatide (Integrilin)	4 horas antes do exame
Warfarin (Marevan, Coumadin)	5 dias antes do exame
Heparina: EV - Endovenosa	2-6 horas antes do exame
Heparina: SC - Subcutânea	12-24 horas antes do exame
Enoxaparina	24 horas antes do exame
Dalteparina (Fragmin)	24 horas antes do exame
Fondaparinux (Arixta)	36-48 horas antes do exame
Rivaroxaban (Xarelto)	3-4 dias antes do exame
Apixaban (Eliquis)	3-4 dias antes do exame

- Trazer os exames realizados anteriormente.

ORIENTAÇÕES APÓS O EXAME

- Não deverá dirigir após o exame ou realizar tarefas que necessitem de atenção, pois seus reflexos estarão diminuídos.
- Não ingerir bebidas alcoólicas por 24 horas.
- Vir acompanhado por um adulto (OBRIGATÓRIO).